

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 278 /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo thông báo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đầu năm 2020 trên địa bàn cả nước có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng vi rút cúm A/H5N6 gây ra tại 5 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Hiện trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay bệnh Cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 25 hộ chăn nuôi ở 7 xã, 5 huyện gồm: Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân và TP Thanh Hoá làm 3.902 con gia cầm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 37.297 con gia cầm. Đa số các ổ dịch phát sinh do hộ chăn nuôi mua giống về nuôi không có nguồn gốc, không qua kiểm dịch; toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo quy định; việc hộ chăn nuôi chưa áp dụng tốt công tác chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, việc kiểm soát người ra vào không bảo đảm an toàn dịch bệnh... là nguồn lây lan dịch bệnh.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25.633 hộ của 2.234 thôn, 457 xã của 27/27 huyện, thị xã, thành phố, buộc phải tiêu hủy 214.204 con lợn. Đến nay, Thanh Hoá có 17 huyện, 420 xã bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã công bố hết dịch; còn 10 huyện, 37 xã chưa công bố hết dịch (trong đó có 24 xã của 7 huyện đã qua 30 ngày và đang làm thủ tục công bố hết dịch, 13 xã của 9 huyện còn dịch chưa qua 30 ngày). Bên cạnh đó từ đầu tháng 2-2020 đến nay, bệnh lở mồm long móng gia súc đã xảy ra tại 17 hộ chăn nuôi làm 98 con trâu bò mắc bệnh.

Theo cơ quan chuyên môn với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay kết hợp với sự chủ quan lơ là của người chăn nuôi trong các khâu phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thì nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi là khá cao. Vì vậy để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. UBND các xã, phường:

- Thực hiện tốt rà soát đầy đủ, chính xác tổng đàn chó mèo, gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn (Lập danh sách từng hộ chăn nuôi, từng thôn, khu phố). Tiến hành luôn thủ tục kê khai ban đầu đối với các hộ (*Tránh trường hợp khi có dịch bệnh xảy ra khi làm thủ tục hỗ trợ mới đi tiến hành kê khai ban đầu thì không chính xác*).

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng ngay sau khi UBND thị xã triển khai một cách khẩn trương và kịp thời.

- Cho hộ dân ký bản cam kết chấp hành nghiêm chủ trương tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch của xã, phường đề ra.

- Tiến hành tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như hướng dẫn nhận biết bệnh để người dân chủ động nắm bắt thông tin qua loa truyền thanh.

- Tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo cán bộ Thú y, khuyến nông, cán bộ địa chính - nông nghiệp bám sát cơ sở để khi dịch bệnh xảy ra tiến hành xử lý khoang vùng và dập dịch khi dịch còn trong diện hẹp.

- Chủ tịch UBND xã, phường là người phải chịu trách nhiệm chính khi dịch bệnh xảy ra mà không kịp thời xử lý trên địa bàn mình.

- Phối hợp xử lý dịch bệnh với cơ quan chuyên môn thị xã (*Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã*) một cách bài bản và khoa học.

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã:

Tăng cường cán bộ chỉ đạo cơ sở, hướng dẫn các xã, phường và hộ chăn nuôi về các quy trình kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với UBND xã, phường sớm phát hiện các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để bùng phát lây lan trên diện rộng. Tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2020 và công tác quản lý vắc xin, thuốc thú y trên địa bàn.

3. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thị xã:

Tăng thời lượng phát sóng, phối hợp với các ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhất là bệnh cúm A/H5N6, hệ thống truyền thanh các xã tuyên truyền cho nông dân biết để thực hiện tốt chủ trương của nhà nước về kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2020 và phòng dịch kịp thời, có hiệu quả.

4. Phòng Kinh tế.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2020; kế hoạch vệ sinh tiêu độc khử trùng kịp thời, đảm bảo hiệu quả cao.

(Có bản Hướng dẫn phòng trừ một số bệnh trên đàn vật nuôi hiện nay kèm theo)

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Thị ủy, HĐND TX (Chỉ đạo);
- Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN thị xã (thực hiện);
- Trung tâm VH, TT, TT & DL thị xã (TTr);
- Lưu: VT, KT.



Tông Thanh Bình

HƯỚNG DẪN
PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRÊN ĐÀN VẬT NUÔI
(Kèm theo Công văn số 278 /UBND-KT, ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND

1. Bệnh Cúm gia cầm:

1.1. Nguyên nhân, đặc điểm chung của bệnh:

- Bệnh do virus Influenza A gây nên bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy hiểm.

- Bệnh lây lan nhanh, mạnh, xảy ra ở tất cả các loại gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, chim, tỷ lệ chết tới 100%.

- Bệnh lây sang người và xảy ra quanh năm, thường phát vào lúc chuyển mùa từ thu sang đông và vào mùa đông.

- Thủy cầm (ngan, vịt) là nơi tàng trữ virus cúm gây bệnh cho gà và con người.

1.2. Đường lây lan:

- Lây chủ yếu qua đường hô hấp, đường tiêu hoá; tiếp xúc giữa con ốm và con khỏe. phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh; Do dụng cụ chăn nuôi thú y nhiễm mầm bệnh. Do tiếp xúc với thủy cầm, chim hoang dã mang mầm bệnh.

- Do vận chuyển gia cầm ủ bệnh từ nơi này đến nơi khác, chưa có kiểm định thú y.

1.3 Triệu chứng:

- Gia cầm bệnh đột ngột sốt cao, thân nhiệt lên tới 44 – 45⁰C.

- Ho khặc, thở khó, khi thở phải há miệng. Chảy nước mắt, nước mũi và dãi dớt liên tục, đứng tím tím vào một chỗ; Mào, tích và hàm dưới sưng, tích nước, xuất huyết đỏ từng đám. Da tím tái và xuất huyết ở dưới da, xuất huyết cẳng chân màu đỏ tươi.

- Tỷ lệ chết có thể rất cao (100% đàn), có thể thấp tùy theo độc lực của mầm bệnh.

1.4. Biện pháp phòng chống:

a. Phòng bệnh

- Chỉ chọn mua giống ở những cơ sở giống tốt, đảm bảo không có bệnh, khoẻ mạnh.

- Không nhốt chung giống mới mua về với vật nuôi ở nhà mà cần cách ly nuôi riêng trong vòng 10 ngày.

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên. Thức ăn, nước uống sạch sẽ.

- Thường xuyên thải loại những gia cầm ốm, yếu ra khỏi đàn.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

b. Khi có dịch bệnh xảy ra

- Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở, chính quyền địa phương khi thấy gia cầm có hiện tượng ốm, chết.

- Không bán chạy, ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi.

- Bao vây ổ dịch, tiêu huỷ toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và gia cầm khác trong đàn, bằng cách đốt, đào hố chôn sâu với chất sát trùng, vôi bột theo quy định của thú y.

- Vệ sinh, tiêu độc ổ dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Lưu ý: khi phát hiện bệnh cúm gia cầm của một cơ sở chăn nuôi thì toàn bộ số gia cầm của cơ sở đó phải bị tiêu huỷ, không điều trị vì: không có thuốc điều trị, bệnh lây sang người.

2. Bệnh LMLM:

2.1. Nguyên nhân gây bệnh lở mồm long móng gia súc:

Bệnh lở mồm, long móng gia súc là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, lây lan nhanh. Bệnh LMLM lây lan qua đường tiếp xúc giữa động vật khoẻ với động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật, thức ăn, nước uống, không khí, chất thải, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, có mang mầm bệnh. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, tỉnh này sang tỉnh khác theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống (kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, móng, sữa, lông,...). Động vật mắc bệnh LMLM là các loài động vật có móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn, dê, cừu, hưu, nai,...

2.2. Triệu chứng bệnh LMLM gia súc: Thời gian ủ bệnh từ 2 - 7 ngày.

- Sốt cao 41 – 42 °C trong 2 - 3 ngày, chảy nước mắt nước mũi khi sốt.

- Nước dãi trắng như bột xà phòng, chảy liên tục thành sợi từ miệng xuống đất.

- Niêm mạc mũi, miệng, lợi răng, trên mặt lưỡi mọc các đám mụn đỏ, sau mọng nước, trắng ra và vỡ loét, để lại các vết sẹo nhiều màu: đỏ, vàng, xám... làm cho gia súc bị bệnh đau đớn, khó ăn uống.

- Quanh các móng chân gia súc khi bị bệnh thường nứt xung quanh bờ móng khi vỡ loét ra, sẽ bị nhiễm trùng và bong móng làm cho gia súc đi lại rất khó khăn và nằm một chỗ.

- Gia súc non có thể biến chứng viêm cơ tim gây chết rất nhanh.

- Gia súc mang thai khi bị bệnh thường sảy thai.

2.3. Phòng bệnh lở mồm long móng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng, chống bệnh LMLM. Thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM theo quy định.

- Cách ly triệt để gia súc ốm, không cho chăn thả tập trung; Có thể dùng một trong các hoá chất sau để tiêu độc, khử trùng: Han-iodine 10%, Benkocid 10%, vôi bột và một số hoá chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Con giống đưa vào chăn nuôi phải khoẻ mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng vắc xin LMLM; trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

2.4. Chữa bệnh LMLM gia súc:

- Chữa miệng: Dùng các chất sát trùng nhẹ, các loại quả chua như khế, chanh bóp mềm, rưới nước (hoặc bơm xịt nước), chà đi, xát lại ở lưỡi, mặt trong má, hàm trên, lợi, bỏ bã vào miệng cho con vật nhai. Dùng vải mỏng thấm nước nói trên xoa vào vùng vết thương 2 – 3 lần/ngày. Có thể dùng một trong các loại

như: xanh Methylen 1%, thuốc tím 1%, , phèn chua 3%, axit acetic 3% hoặc dùng thuốc mỡ Tetracilin, Penicilin bôi vào vết thương.

- Chữa móng: vệ sinh bằng nước muối, nước lá chát, hoặc thuốc tím, phèn chua, dấm ăn; sau đó bôi các chất sát trùng hút mủ, nhanh lên da non ở vùng móng bị bệnh (bột xoan trộn với dầu lạc, diêm sinh). Để đề phòng ruồi nhặng đẻ trứng vào kẽ móng, có thể dùng Cresin pha loãng hoặc dùng thuốc lào, một ít băng phiến đắp vào vết thương.

- Chữa vú: Rửa mụn loét bằng nước muối ấm, dung dịch axit boric 2-3% hoặc nước xà phòng, các thuốc sát trùng vào vết thương.

- Chăm sóc cho gia súc, đảm bảo giữ chuồng khô ráo, sạch sẽ, lót chuồng dày cho gia súc nằm, cho ăn cỏ tươi, cỏ mền; bổ sung cho gia súc ăn cháo khi bị bệnh nặng.